

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR



BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TÜRÜ	İLACIN ADI	İLACIN DOZU	İLACIN ALINMA ŞEKLİ ve ZAMANI	İLACIN ETKİ ve YAN ETKİSİ
ÜLFONİLÜRELER	AMARYL	1 - 2 - 3 - 4 - 6 mg	Yemekten 5-15 dakika önce alınır.	İnsülin sekresyonunu artırır. En önemli yan etkileri hipoglisemidir.
	BETANORM	80 mg		
	BETANORM MR	30 mg		
	DIAMEPRID	2 mg		
	DIAMICRON	80 mg		
	DIAMICROM MR	30 - 60 mg		
	EFIKAS MR	30 mg		
	GLUCOTROL XL	2,5 - 5 - 10 mg		
	GLUMIKRON	80 mg		
	GLIKRON	80 mg		
	GLIMAX	2 mg		
	HIPOGLIS	30 mg		
	INSUPRID	2 mg		
	MEPIRIKS	1 - 2 - 3 mg		
	ORAMIKRON	80 mg		
SANPRID	1 - 2 - 3 - 4 mg			
TIDECA	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 mg			
MEGLİTİNİDLER	DIAFREE	0,5 - 1 - 2 mg	Yemekten 5-15 dakika önce alınır.	Hipoglisemi riski sulfonilürelere göre daha azdır.
	DIALIX	120 mg		
	INCURIA	120 - 180 mg		
	NAGLID	60 - 120 mg		
	NATELIX	120 mg		
	NOVADE	0,5 - 1 - 2 mg		
	NOVONORM	0,5 - 1 - 2 mg		
	REPAFIX	0,5 - 1 - 2 mg		
	STARLIX	120 - 180 mg		
	TEGLIX	120 mg		
	REPELIT	0,5 - 1 - 2 mg		
	REPLIC	0,5 - 1 - 2 mg		
BİGUANİDLER (METFORMİN)	DIAFORMIN	850 - 1000 mg	Yemekten 5-15 dakika sonra alınır.	İnsülin salınımını artırır. Gastrointestinal yan etkileri nedeniyle ilaç dozu doktor istemine göre progresif artırılmalıdır. Doktor istemine göre pre-op 48-72 saat önce stoplanmalı, post-op 48-72 saat sonra da başlanmalıdır.
	GLANGE	850 - 1000 mg		
	GLIFOR	850 - 1000 mg		
	GLIFOR SR	500 mg		
	GLUCOPHAGE	500 - 850 mg		
	GLUFORCE	850 - 1000 mg		
	GLUFORMIN RETARD	850 - 1000 mg		
	GLUKOFEN	500 - 850 mg		
	GLUKOFEN RETARD	850 - 1000 mg		
	INSUFOR	500 - 850 mg		
	MATOFIN	500 - 850 mg		
	MATOFIN XR	500 mg		
	METFULL	500 - 850 -1000 mg		
METVEL	850 - 1000 mg			
TIAZOLIDİNDİONLAR	ACTOS	15 - 30 mg	Yemekle birlikte veya yemekten 5-15 dakika önce alınır.	En önemli yan etkileri periferik ödemdir.
	DIALIC	15 - 30 - 45 mg		
	DROPIA	15 - 30 - 45 mg		
	DYNDION	15 - 30 - 45 mg		
	GLIFIX	15 - 30 - 45 mg		
	PIOFORCE	15 - 30 - 45 mg		
	PIOGTAN	15 - 30 - 45 mg		
	PIONDIA	15 - 30 - 45 mg		
	PIXART	15 - 30 - 45 mg		
ALFA GLİKOZİDAZ İNHİBİTÖRLERİ	GLUCAR	50 -100 mg	Yemeğin ilk lokması ile çiğnenerek alınır.	Karbonhidratların sindirimini yavaşlatarak tokluk kan şekeri düşürürler. Gastrointestinal yan etkileri nedeniyle ilaç dozu doktor istemine göre progresif artırılmalıdır.
	GLUCOBAY	50 -100 mg		
	GLYNOSE	50 -100 mg		
	OADOR	50 -100 mg		
SODYUM-GLUKOZ KO-TRANSPORTER 2 İNİBİTÖRLERİ (SGLT 2-i)	FARXIGA	10 mg	Yemekten bağımsız olarak alınır.	Böbrekten glukoz reabsorpsiyonunu azaltarak, idrar yolu ile glukoz ekskresyonunu artırır. Genitoüriner (özellikle kadınlarda) enfeksiyonlara yol açmaları nedeniyle dikkatli olunmalıdır.
	FORZIGA	10 mg		
	FORXIGA	10 mg		
HAZIR ORAL ANTİDİYABETİK KOMBİNASYON PREPERATLARI	ACORT	15/850 mg	Yemekten bağımsız olarak alınır.	
	ACTOS PLUS-MET	15/1000 mg		
	COMPETAST	15/850 mg		
	DROPIA-MET	15/500 - 850 mg		
	GLIFIX PLUS	15/850 - 1000 mg		
	PREKO	15/500 - 850 mg		
	PIO-MET	15/500 - 850 mg	Yemekle birlikte alınır.	
	JANUMET	50/500 - 850 - 1000 mg		
	VELMETİN	50/500 - 850 - 1000 mg	Yemekle birlikte veya yemekten hemen sonra alınır.	
	EUCREAS	50/500 - 1000 mg		
	GALİPTİN	50/100 mg		
	GALVUS MET	50/850 - 1000 mg		
İNSÜLİNOMİMETİK İLAÇLAR	GALVUS	50 mg	Yemekten bağımsız olarak alınır.	Endojen insülin sekresyonunu artırır. Bu grup ilaçlarda en önemli yan etki, çoğu kez zamanla hafifleyen bulantıdır. Bazı hastalarda kusma ve diyare de görülebilir. Pankreatit riski vardır.
	JANUVIA	100 mg		
	ONGLYZA	2,5 - 5 mg		
	TRADJENTA	5 mg	Sabah ve akşam yemekten 0-60 dk önce yapılır.	
	BYETTA	5 - 10 mg kartuş (sc)		
	VICTOZA	6 mg / ml kartuş (sc)		
		Yemekten bağımsız olarak yapılır.		